

# Mögliche Pflanzenschutzstrategie 2018







# Zwetschgen IP







Martin Keller  
In Zusammenarbeit mit F. Weibel LZE Sissach

Für ..... Parzelle: ..... Datum .....

Stadium	Produkte	kg/lt/ha	Wartefrist	GWA-auflagen	Bakterienbrand	Schrotschuss	Monilia (Bl.+Zw.)	Fruchtmotilia	Sprühflecken	Zwetschgenrost	Kirschblütenmotte	Frostspanner	Schalenwickler	Blattläuse	Pflaumenwickler	KEF	Kirschkernstecher	Wanzen	Gem. Spinnmilben	Rote Spinnmilben	Trips	Bemerkungen	Datum
 51	Cuprum Flow <sup>1)</sup> Weissöl S  Rebell Rosso + Köderflüssigkeit	2,4lt 32lt			x						(x)	(x)	(x)						(x)	x		Öl ab 12 Grad C; auch im Stadium 51 möglich; nicht gegen Kommaschildlaus; 1000-1600 L Wasser je nach Baumvolumen x Ungleicher Holzbohrer	
 53	Delan WG <sup>2)</sup> +Kumulus WG (Schwefel) <sup>4)</sup>	0,5kg 4kg		50m	x	x		x											(x)	(x)		Strategie die 5 x Delan-Einsatz erlaubt (siehe Fussnote) Alternativ Kupfer weiter führen	
 57	Delan WG +Kumulus WG (Schwefel)	0.5kg 4kg		50m	x	x		x											(x)	(x)		Reserve bei anhaltend infektiöser Witterung	
 59	Delan WG +Kumulus WG (Schwefel) +Pyrinex ME 22 (oder Reldan 22) Verwirrung mit Isomate OFM Rosso wo grosse isolierte oder eingenetzte Anlagen	0,5kg 4kg 3,2lt		50m 50m	x	x		x			x	(x)	(x)						(x)	(x)		Pyrinex/Reldan nicht in offene Blüte spritzen (Bientox) Nicht verwechseln mit original Pyrinex (Ethyl) (im Obstbau nicht mehr bewilligt!)	

Stadium	Produkte	Kg/lt/ha	Wartefrist	GWA-auflagen	Bakterienbrand	Schrotschuss	Monilia (Bl.+ Zw.)	Fruchtmolli	Sprühflecken	Zwetschgenrost	Kirschblütenmotte	Frostspanner	Schalenwickler	Blattläuse	Pflaumenwickler	KEF	Kirschkernstecher	Wanzen	Gem. Spinnmilben	Rote Spinnmilben	Trips	Kl. Fruchtwickler	Bemerkungen	Datum
 61	Cercobin <sup>3)</sup> +Folpet 80 DWG (Capex statt Pyrinex)	2lt 2kg		50m 20m	x	x	x		x				x						(x)	(x)			Alternativstrategie (jährlich wechseln) zu Cercobin und Baldo: SSH-Mittel (z.B. Slick)+Prolectus oder Teldor	
 65	Baldo <sup>3)</sup> +Folpet WDG	1,6kg 2kg		20m		x	x	x	x														Bei sehr langer Blüte evtl. 2x Alternativstrategie (jährlich wechseln) zu Cercobin und Baldo: SSH-Mittel (z.B. Slick)+Prolectus oder Teldor	
 67	Cercobin +Folpet 80 WDG	2lt 2kg		50m 20m		x	x	x	x															
 69	Delan WG +Kumulus WG (Schwefel)  (2. Beh. Capex)	0,5kg 2kg		50m	x	x		x	x				x											
 72	Delan WG +Kumulus WG (Schwefel)  + wenn nötig <input checked="" type="checkbox"/> Pirimor + Audienz falls kl. Fruchtwickler	0,5kg 2kg  0,64kg 2dl		50m  50m 20m	x	x		x	x				x									x		
 75	Folpet 80 DWG +Flint	2kg 0,4kg				x	x	x	x	x														

Stadium	Produkte	Kg/lt/ha	Wartefrist	GWA-auflagen	Bakterienbrand	Schrotschuss	Monilia (Bl.+ Zw.)	Fruchtmonilia	Sprühflecken	Zwetschgenrost	Kirschblütenmotte	Frostspanner	Schalenwickler	Blattläuse	Pflaumenwickler	KEF	Kirschkernstecher	Wanzen	Gem. Spinnmilben	Rote Spinnmilben	Trips	Kl. Fruchtwickler	Bemerkungen	Datum
 78	<input checked="" type="checkbox"/> Folpet 80 DWG +Kumulus WG (Schwefel)  <b>+Affirm</b>	2kg 2kg  <b>3,2kg</b>		20m		x			x	x													<b>Für Behandlungszeitpunkte Sorte und Prognosemodelle beachten. Wirkt 2-2.5 Wochen Im Jahreswechsel mit Stewart</b>	
 81	<input checked="" type="checkbox"/> Moon Privilege + <input checked="" type="checkbox"/> Flint <b>+<input checked="" type="checkbox"/> Affirm</b> <b>Nekagard (Repellentium)</b>	0,28lt 0,28kg <b>3,2kg</b> 2kg	2Wo 2Wo 3Wo	20m		x	x (x)			x		x			x	(x) (x)							<b>=Moon-Sensation</b>  <b>Spätere Sorten als Fellenberg Sorten 3 Beh. mit Wirkstoff- wechsel (Audienz vorziehen)</b>	
 85	<input checked="" type="checkbox"/> Moon Privilege + <input checked="" type="checkbox"/> Flint  <b>Nekagard (Repellentium)</b>	0,28lt 0,28kg  <b>2kg</b>	2Wo 2Wo			x	x (x)			x						(x)								
 87	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Audienz</b> <sup>6)</sup>	<b>0,02lt</b>	7T	20m												x							<b>Am Abend applizieren (UV- empfindlich und Bienentox) Allgemeinverfügung beachten</b>	
Nachernte 93	Delan WG <b>+Blattdüngung nach Nährstoffplan</b>	0,8kg		50m		x			x	x													<b>N-Blattdünger muss in Swissbilanz</b>	
Bei Blattfall 98	Bordeauxbrühe oder Mycosin oder Nekagard plus Cuprum Flow	8kg 8kg/1lt				x																		

■ = Fungizid ■ = Insektizid ■ = Biocontrol ■ = Blattdünger

- (x) = Teilwirkung;  verursacht so angewendet wahrscheinlich Rückstandsnachweis > 0.01 ppm

1) Maximal 4kg Reinkupfer/Jahr

2) Dithianon (Delan) max. 1680 g/ha, J im Steinobst das heisst: 5 x 0.5kg Delan + 2 kg Schwefel oder 3 x 0.8kg Delan pro Jahr

3) Baldo 2x, Cercobin 2x, Strobilurine 3x, SDHI 3x

4) Schwefel bis 15°C 4kg und mehr, bis 25°C 2kg, ab 25°C 1kg

5) Stand der Bewilligungen und Auflagen des BLW am 05.12.2017

6) Allgemeinverfügung beachten